


## pRhind, Nr. 26

pRhind, Nr. 26

Text



## Transkription und Übersetzung

$$\bar{4} \text{ hr}^c \bar{4} = f \text{ hr} = f \text{ hr} = f m \ 15$$

$$w3h\text{-}tp \ m \ 4$$

$$jrj.\text{hr} = k \ \bar{4} = sn \ m \ 1.$$

$$dmd \ 5$$

$$^2 w3h\text{-}tp \ m \ 5 \ r \ gm.t \ 15$$

$$^3 \backslash \cdot \quad 5$$

$$^4 \backslash 2 \quad 10$$

$$^5 | \text{hr}.\text{hr} \ 3$$

$$w3h\text{-}tp \ m \ 3 \ zp \ 4$$

$$^6 | \cdot \quad 3$$

$$^7 | 2 \quad 6$$

$$^8 \backslash 4 \quad 12$$

$$^9 | \text{hr}.\text{hr} \ 12$$

$$^{10} | \cdot \quad 12$$

$$^{11} | \bar{4} \quad 3$$

$$^{12} | \text{hr}^c \quad 12$$

$$^{13} | \bar{4} = f \ 3 \ dmd \ 15$$

**Eine Menge, ihr  $\bar{4}$  zu ihr**, indem 15 resultiert.

Rechne mit 4!

Dann berechnest du ihr  $\bar{4}$  als 1.

Summe: 5.

Dividiere 15 durch 5!

Dann resultiert 3.

Multipliziere 3 mit 4!

Dann resultiert 12.

**die Menge 12,**

ihr  $\bar{4}$  (ist) 3, Summe: 15.

## Anmerkungen

## Zeile 1

$\bar{4} = sn$ , 4 wird als Plural behandelt, s. PEET, 1923a, S. 62 mit Verweis auf SETHE, 1916, S. 44–51.